

‘Mag het een onsje meer zijn?’

**‘De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers
met overgewicht’**

15 oktober 2015

Viona Lapré-Utama

Inhoud

- Inleiding
- Vraagstelling
- Methode
- Resultaten
- Beschouwing
- Conclusie/aanbevelingen

Inleiding

- Eerder onderzoek door De Amersfoortse ism. het UMCG. *TBV – April 2013*
- Overgewicht: $\text{BMI} \geq 25 \text{ kg/m}^2$
- Obesitas: $\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$
- Leidt tot gezondheidsrisico's en heeft ook economische consequenties

Inleiding

- Acceptatie:
 - Eenmalige beoordeling
 - Risico-inschatting op arbeidsongeschiktheid in de toekomst
- Obesitas: premietoeslag
- Overgewicht: normaal geaccepteerd

Vraagstelling

- ‘In welke mate verschillen verzekerde zelfstandig ondernemers met overgewicht, met verzekerde zelfstandig ondernemers zonder overgewicht, **in de kans op minimaal één episode van arbeidsongeschiktheid** 5 jaar na ingang van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?’
- Verschil tussen deze twee groepen ten aanzien van:
 - Arbeidsongeschiktheidsfrequentie
 - Gemiddelde arbeidsongeschiktheidsduur
 - Gemiddelde tijd tot eerste arbeidsongeschiktheidsmelding

Methode

- Observationeel vervolgonderzoek,
- follow-up duur 5 jaar
- Inclusiecriteria:
 - AO-verzekering afgesloten in januari 2008
 - Zelf gerapporteerde BMI tussen de 20-30
- BMI groep 20-25: n=199
- BMI groep 26-30: n=219

Methode

- Ingangs- en einddatum polis
- Soort polis
- Leeftijd
- Geslacht
- Beroepsklasse
- Opleidingsniveau
- ER-termijn
- Verzuim in VG
- Aantal jaren zelfstandig
- Aantal jaren in verzekerde beroep
- Roken, alcohol, drugs
- Clausule
- Royementsdatum
- Per claim datum van AO-melding
- Aantal AO-meldingen
- Duur van de AO-heid
- Aantal dagen tot 1^e AO-melding
- Einddatum follow-up 31 januari 2013

Resultaten


Kans op AO-heid in 5 jaar

BMI groep 20-25:

19,1% (95% BI 13,7% - 24,5%)

BMI groep 26-30:

14,2% (95% BI 10,3% - 18,1%)



Resultaten

	Verschil (in %) tussen de BMI 20-25 groep en BMI 26-30 groep in de kans op AO-heid	95% BI
Ruwe verschil	-4,9	-12,0 – 2,2
Gecorrigeerd voor:		
Geslacht	-4,5	-11,8 – 2,8
Opleiding	-5,8	-12,9 – 1,3
Leeftijd	-3,9	-11,2 – 3,4
Soort polis	-4,7	-12,0 – 2,6
Frequentie voorgaand verzuim (2wkn-3 maanden)	-5,0	-12,3 – 2,3
Clausule	-5,7	-13,0 – 1,6
Aantal jaren in verzekerd beroep	-3,7	-11,0 – 3,6
Royement	-4,8	-12,1 – 2,5
Verschil gecorrigeerd voor alle confounders	-3,7	-11,5 – 4,1

Resultaten

	BMI 20-25 (n=199)		BMI 26-30 (n=219)	
	n (%)	Gemiddelde (95% BI)	n (%)	Gemiddelde (95% BI)
AO-frequentie				
1	34 (17,1)		24 (11)	
2	3 (1,5)		5 (2,3)	
3	1 (0,5)		2 (0,9)	
Gem. AO-frequentie		0,22 (0,15 - 0,28)		0,18 (0,12 – 0,25)
Gem. AO-duur (dagen)		53,6 (29,6 – 77,7)		51,6 (26,8 – 76,3)
Gem. duur tot 1^e AO-melding		1608 (1545 – 1671)		1599 (1537 – 1661)

Beschouwing

- Overgewicht vormt in de eerste 5 jaar van de verzekering geen verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid
- Verklaring:
 - Relatief jonge onderzoekspopulatie (gemiddeld 36 jaar bij aanvang polis)
 - Relatief korte follow-up duur

Beschouwing

- Gegevens op basis van zelfrapportage
 - Mogelijk onderrapportage van het gewicht
- Geen inzicht in de ontwikkeling van het gewicht
- Invloed van de buikomvang?

Conclusie/Aanbevelingen

- JA, het mag een onsje meer zijn!
- Geen reden om huidige acceptatiebeleid bij overgewicht te wijzigen
- Nader onderzoek:
 - Langere follow-up
 - Groep met obesitas

Dank voor uw aandacht!

